

Impfkalender (Standardimpfungen) - Stand Juli 2011 -
 Standardimpfungen = Regelimpfungen für alle Kinder, alle Jugendlichen und alle Erwachsenen



Impfung gegen	Mögliche Infektion bei der Geburt	Lebensalter								
		2 Monate	3 Monate	4 Monate	11-14 Monate	15-23 Monate	5-6 Jahre	9-11 Jahre	12-17 Jahre	ab 18 Jahre
Tetanus		1. Impfung	2. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung	3. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung	4. Impfung ab 6 Monate nach der letzten Impfung		Auffrischung 5 - 10 Jahre nach der letzten Impfung	Auffrischung 5 - 10 Jahre nach der letzten Impfung	Auffrischung 10 Jahre nach der letzten Impfung, einmalig Kombinationsimpfstoff mit Keuchhustenkomponente	
Diphtherie		1. Impfung	2. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung	3. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung	4. Impfung ab 6 Monate nach der letzten Impfung		Auffrischung 5 - 10 Jahre nach der letzten Impfung	Auffrischung 5 - 10 Jahre nach der letzten Impfung	Auffrischung 10 Jahre nach der letzten Impfung, einmalig Kombinationsimpfstoff mit Keuchhustenkomponente	
Keuchhusten		1. Impfung	2. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung	3. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung	4. Impfung ab 6 Monate nach der letzten Impfung		Auffrischung 5 - 10 Jahre nach der letzten Impfung	Auffrischung 5 - 10 Jahre nach der letzten Impfung		
Haemophilus influenzae B		1. Impfung	2. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung	3. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung	4. Impfung ab 6 Monate nach der letzten Impfung					
Inaktivierte Polio Vakzine		1. Impfung	Bei Anwendung monovalenter bzw. von Impfstoffen ohne Keuchhustenkomponente kann diese Dosis entfallen	3. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung	4. Impfung ab 6 Monate nach der letzten Impfung			Auffrischung 5 - 10 Jahre nach der letzten Impfung		
Hepatitis B	1. Impfung plus Immunglobulin	1. Impfung		3. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung	4. Impfung ab 6 Monate nach der letzten Impfung			Grundimmunisierung , wenn bisher nicht erfolgt		
Pneumokokken		1. Impfung	2. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung	3. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung	4. Impfung ab 6 Monate nach der letzten Impfung					1 Impfung ggf. Wiederholung nach 5 Jahren
Meningokokken					1 Impfung ab dem Alter von einem Jahr					
Masern Mumps Röteln					1. Impfung	2. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung				
Windpocken					1. Impfung	2. Impfung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung		Grundimmunisierung , wenn bisher nicht erfolgt und Erkrankung nicht durchgeführt		
Humane Papilloma Viren									1. bis 3. Impfung für alle Mädchen	
Influenza										Impfung jedes Jahr